

Les oiseaux cavernicoles les plus fréquents



Mésange charbonnière

ø trou d'envol	30–32 mm
Œufs par nichée	6–12
Durée de couvaision	13–14 jours
Séjour au nid	18 jours
Ponte(s)	1–2
Construction du nid	dès fin mars



Mésange bleue

ø trou d'envol	26–28 mm
Œufs par nichée	6–15
Durée de couvaision	13–15 jours
Séjour au nid	19–20 jours
Ponte(s)	1–2
Construction du nid	dès fin mars



Mésange nonnette

ø trou d'envol	26–28 mm
Œufs par nichée	6–10
Durée de couvaision	14 jours
Séjour au nid	18 jours
Ponte(s)	1
Construction du nid	dès fin mars



Mésange noire

ø trou d'envol	26–28 mm
Œufs par nichée	6–10
Durée de couvaision	14 jours
Séjour au nid	16–23 jours
Ponte(s)	1–2
Construction du nid	dès fin mars



Mésange huppée

ø trou d'envol	26–28 mm
Œufs par nichée	5–8
Durée de couvaision	14 jours
Séjour au nid	20–22 jours
Ponte(s)	1–2
Construction du nid	dès mi-mars



Sittelle torchepot

ø trou d'envol	32 mm
Œufs par nichée	5–8
Durée de couvaision	15–18 jours
Séjour au nid	24 jours
Ponte(s)	1
Construction du nid	dès mars

Moineau domestique

ø trou d'envol	32 mm
Œufs par nichée	4–6
Durée de couvaision	12–14 jours
Séjour au nid	13–17 jours
Ponte(s)	2–3
Construction du nid	dès mi-mars



Moineau friquet

ø trou d'envol	30–32 mm
Œufs par nichée	4–6
Durée de couvaision	11–13 jours
Séjour au nid	13–15 jours
Ponte(s)	2–3
Construction du nid	dès fin mars



Etourneau sansonnet

ø trou d'envol	45–50 mm
Œufs par nichée	4–6
Durée de couvaision	12–13 jours
Séjour au nid	20 jours
Ponte(s)	1–2
Construction du nid	dès mi-mars



Rougequeue à front blanc

ø trou d'envol	32 ou 30 × 50 mm
Œufs par nichée	5–7
Durée de couvaision	12–14 jours
Séjour au nid	13–17 jours
Ponte(s)	1(–2)
Construction du nid	dès fin avril



Gobemouche noire

ø trou d'envol	30–32 mm
Œufs par nichée	5–8
Durée de couvaision	13 jours
Séjour au nid	14–18 jours
Ponte(s)	1
Construction du nid	dès fin avril



Les moineaux domestiques et friquets utilisent occasionnellement les nichoirs ayant un trou d'envol de 30 mm ou plus. En de nombreux endroits, ces deux espèces sont plus rares que p. ex. les mésanges charbonnières. C'est pourquoi les moineaux devraient être tolérés. D'autres animaux comme les loirs, les bourdons et les frelons peuvent s'installer dans les nichoirs. Si possible, il faut laisser ces animaux occuper les nichoirs.